

サンクレスタル[®] 乳剤

Ⓜはサンクネイ化学(株)の登録商標

上手な使い方

このような場面で！

- 抵抗性回避を目的にローテーション防除に組み込む場合
- 作期の長い作物で、化学合成農薬の温存として
- 天敵を利用してしている場面



農林水産省登録 第20316号
有効成分：脂肪酸グリセリド 90.0%
性：普通物
(毒劇物に該当しないものを指している通称)
規格 格：500ml

効果のある
病害虫

ハダニ類
アブラムシ類
コナジラミ類
トマトサビダニ
チャノホコリダニ
うどんこ病

特長

- ① 植物油を有効成分とする安全性の高い薬剤です。
- ② 抵抗性や耐性菌発生が少ない物理的防除剤です。
- ③ 収穫前日まで使用可能で、散布回数制限もありません。
- ④ 有機栽培農産物生産にも使用可能です。
- ⑤ 有効成分はポジティブリスド制度の対象外物質です。

効果的な使用方法

- 本剤は物理的に作用する剤であり、散布液が直接病害虫にかからないと効果が発揮されません。病害虫にムラなくかかるよう、葉の表裏へ丁寧に十分散布しましょう。
- 1週間間隔で300～600倍希釈液を2～3回連用すると効果的です（アブラムシ類、コナジラミ類は300倍）。
- 多発時は散布間隔を短縮することをおすすめします。
- 他剤との同時防除で汚れ軽減効果のあることが確認されています。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10㎡あたり 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	脂肪酸グリセリドを含む 農薬の総使用回数
野菜類 (なす、トマト、 ミニトマトを除く)	アブラムシ類 コナジラミ類	300倍	150～500ℓ	収穫前日まで	—	散布	—
	ハダニ類 うどんこ病	300～600倍					
なす	アブラムシ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ	300倍	150～500ℓ	収穫前日まで	—	散布	—
	ハダニ類 うどんこ病	300～600倍					
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類 トマトサビダニ	300倍	200～700ℓ	—	—	—	—
	ハダニ類 うどんこ病	300～600倍					
りんご いちじく かんきつ	ミカンキジラミ	600倍	200～700ℓ	—	—	—	—
	げっぎつ	—					
花き類・観葉植物	ハダニ類 うどんこ病	150～500ℓ	150～500ℓ	—	—	—	—

平成22年7月21日現在の登録内容